


仿單標籤粘貼表



產品名稱	“維星”安碘擦洗液	申請廠商	維星生技有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製	字第	055537 號

109. 7. 24

“維星”安碘擦洗液

Andine Scrub Solution “Ever Star”

衛署藥製字第 055537 號

GMP G-11148

【成分（有效成分及含量）】：每毫升中含有

Povidone Iodine.....75mg（相當於有效碘 7.5mg）

【其它成分（賦形劑）】：Disodium Laureth Sulfosuccinate/ Hydroxypropyl methylcellulose/
Sodium Citrate/ Purified Water。

【用途（適應症）】：緊急處理擦傷、切傷、刺傷、抓傷等皮外之傷口及傷口周圍的洗淨、
消毒、殺菌來防止傷口的感染。

【不得使用族群】：曾因本藥成分引起過敏。

【用法用量】：一日數次，塗抹於患部，或以紗布、脫脂棉等沾取塗抹。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】：0800-220989

【使用上注意事項】：請詳閱說明書

【警語】：請詳閱說明書

【包裝】：4000 毫升以下塑膠瓶裝

【儲存】：置於 25°C 以下保存


藥 商：維星生技有限公司-台中市北區國強街 3 號

製造廠：恒安製藥工業股份有限公司-台中市西屯區工業一路 101 號

網址：<http://www.emg0077.com.tw>

批號：

保存期限：



※ 外文仿單應檢附中文譯文

註

- (1) 報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。
- (2) 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。



109. 7. 24

"維星"

安碘 擦洗液

外用

Andine Scrub Solution "Ever Star"

GMP G-11148
衛署藥製字第055537號

【成分 (有效成分及含量)】: 每毫升中含有

Povidone Iodine.....75mg (相當於有效碘 7.5mg)

【其它成分 (賦形劑)】:

Disodium Laureth Sulfosuccinate/ Hydroxypropyl methylcellulose/ Sodium Citrate/ Purified Water.

【用途 (適應症)】: 緊急處理擦傷、切傷、刺傷、抓傷等皮外之傷口及傷口周圍的洗淨、消毒、殺菌來防止傷口的感染。

【使用上注意事項】:

- 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 1. 3歲以下。
 2. 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. 勿超過建議使用量或使用次數。
 4. 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。
 5. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
 6. 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜 (如口腔、鼻腔、陰道、外陰部等)、濕疹、燙傷、龜裂或嚴重外傷之患部。
 7. 除非有醫師、藥師、藥劑生指示，本藥勿使用於大面積之體表 (以使用者的兩手掌面積為參考)。
 8. 本藥有全身性吸收之可能性，因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及哺乳婦有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。
 9. 會使皮膚或衣物染色。
 10. 請注意不要誤入眼睛，萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
 11. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

【用法用量】: 一日數次，塗抹於患部，或以紗布、脫脂棉等沾取塗抹。

【警 語】:

- 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 1. 若有任何不適情況產生。
 2. 使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。
 3. 使用後出現蕁麻疹、浮腫、胸悶等症況，及臉色蒼白、手腳冰冷、冒冷汗、呼吸困難等現象。

【包 裝】: 4000毫升以下塑膠瓶裝。

【儲 存】: 25°C以下儲存

【類 別】: 醫師藥師藥劑生指示藥品

【委 託 者】: 維星生技有限公司

【地 址】: 台中市北區國強街3號

【製 造 廠】: 恒安製藥工業股份有限公司

【地 址】: 台中市工業區一路101號

