


註

- (1) 報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。
- (2) 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。



(外用) "維星"潔利膚殺菌消毒液
 Jolife Skin Antiseptic Solution "Ever Star"
 衛部藥製 字第058259號



【成分(有效成分及含量)】：每ml含有：
 Chlorhexidine Gluconate 20% w/v solution.....0.025mL
 (eq. to 5 mg of Chlorhexidine Gluconate)
 【其它成分(賦形劑)】：
 Alcohol 95%.....0.737mL
 (eq. to Ethanol 0.70mL)
 - Purified Water

【用途(適應症)】：一般外用消毒劑，可當作初步傷口處理。

【使用上注意事項】：

- 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 1. 3歲以下。
 2. 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師或藥劑師：兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食請妥當保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. 勿超過建議使用量或使用次數。
 4. 使用部位或其周圍刷牙時，請洗乾淨後再用藥。
 5. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
 6. 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、外陰部等）、尿布、燙傷、蟲咬或嚴重外傷之患部。
 7. 請注意不要誤入眼睛，萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
 8. 除非有醫師、藥師、藥劑師指示，本藥勿使用於大面積之體表（以使用者的兩手掌面積為參考）。
 9. 使用後請保持塗抹部位通氣，勿密封，以免增加副作用。
 10. 避免接觸外耳道，尤其耳膜破裂時進入中耳，有造成耳聾之虞。
 11. 請勿和非離子界面活性劑及離子型物質（如氫離子、碘化鉀）併用，因會降低本藥效用。

108.11.07

【用法用量】：使用時不用稀釋，取適量直接塗於患部。

【警 告】：

- 一. 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	刺激感、皮膚炎、過敏性反應。

- 二. 使用本藥後，若有發生以下症狀，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有上述外之其他不適情況產生。
2. 使用了天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包 裝】：4000毫升以下塑膠瓶裝。

【儲 存】：25°C以下儲存

【類 別】：醫藥師藥劑生指示藥品

【委託者】：維星生技有限公司

【地 址】：台中市北區國強街9號

【製造廠】：恆安製藥工業股份有限公司

【地 址】：台中市工業區一路101號



藥商地址請依所轄衛生局核定內容刊載

仿單標籤粘貼表

產品名稱	“維星”潔利膚殺菌消毒液	申請廠商	維星生技有限公司
衛生署給證號碼	衛部藥製 字 第 058259 號		



“維星”潔利膚殺菌消毒液

Jolife Skin Antiseptic Solution “Ever Star”

【成分（有效成分及含量）】

每毫升中含有

Chlorhexidine Gluconate.....5mg/mL

其它成分（賦形劑）

Alcohol95%.....0.737mL/mL

(eq.to Ethanol—0.70mL)

· Purified Water ·

【用途（適應症）】：一般外用消毒劑，可當作初步傷口處理。

【不得使用族群】：曾因本藥成分引起過敏的人。

【用法用量】：使用時不用稀釋，取適量直接塗於患部。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】：0800-220989

【使用上注意事項】：請詳閱說明書

【警語】：請詳閱說明書

【包裝】：4000 毫升以下塑膠瓶裝

【儲存】：置於 25℃ 以下保存

藥 商：維星生技有限公司-台中市北區國強街 3 號

製造廠：恆安製藥工業股份有限公司-台中市西屯區工業一路 101 號

網址：<http://www.emg0077.com.tw>

批號：

保存期限：



108.11.07



※ 外文仿單應檢附中文譯文